

地温が上がってくると、栄養成長に傾き易くなります。できるだけ窒素を抑えて、株を抑えて下さい。灌水量も増やしていかないと、果形が細くなってきます。ダニ、アザミウマに要注意です。満開時は必ずアザミウマの防除を行って下さい。

3月の管理

| | 防除 | 液肥(土耕) | 高設給液 |
|-----|--|--|---|
| 第1週 | イロハコート2500倍 ラクトプラス1000倍 サンパワーカリ500倍 プリベントマグ1000倍 スーパーアシスト500倍 | ふたばエキス1ℓ えいさーG1 ℓ SAT-1かん水 (天敵入れない場合) | EC0.7 pH6.5 35ml×4~5回/株 亜リン酸カリ10000倍 (継続) |
| 第2週 | スピノエース5000倍 ラクトプラス1000倍 プリベントマグ1000倍 ふたばエキス500倍(臭い対策) ミツバチ4日以上 | スーパーアシスト2Kg カルパンチ1ℓ かん水 プリベントマグ500ml | |
| 第3週 | イロハコート2500倍 ラクトプラス1000倍 サンパワーカリ500倍 プリベントマグ1000倍 スーパーアシスト500倍 | ふたばエキス1ℓ えいさーG1 ℓ | EC0.7 pH6.5 35ml×4~5回/株 |
| 第4週 | ダニが多い場合 カネマイト1000倍 プリベントマグ1000倍 | スーパーアシスト2Kg カルパンチ1ℓ かん水 プリベントマグ500ml | |

灌水量が足りない圃場が目立ちます。水不足は収量に直結します。できるだけ午前中に灌水を行い、地温を冷やして下さい。

日中の温度を20~25℃で管理し、過熟を減らして下さい。

春の品質維持にカルパンチ


カルパンチは通常のカルシウム剤よりも、吸収されやすい加工がしてあり、灌水した次の日から実が硬くなることを実感できます。実が柔らかい時、手擦れが多い時、徒長する時は是非お試し下さい。

使用方法

灌水：1~2ℓ/10a
葉面散布：500~1000倍

おすすめ使用方法

プリベントマグ1000倍+カルパンチ1000倍+スーパーアシスト500倍+ラクトプラス1000倍
※農薬との混用の際は要注意(ご確認下さい)



被膜剤の有効性

減農薬資材でありながら、葉ダニに対して効果が高いことから注目されています。天敵導入後でも使用可能な被膜剤が多くあります。是非防除ローテーションに組み込んで下さい。

| | 効果 | 葉害リスク | 備考 |
|----------------------------|----|-------|-----------------------|
| イロハコート2500倍 | 高 | 中 | ハーブによる忌避効果も有り |
| サフオイル300倍 | 中 | 中 | まくびか3000倍と混用 |
| トモノールS150倍 ハーベストオイル200倍 | 高 | 高 | 油の純度が高いため、化学剤との混用は避ける |

被膜剤は花粉を固着させ、奇形になる可能性があります。満開時の使用は避け、2週間に1回のペースで使用して下さい。

※葉ダニには効果があるのに天敵には効かない理由は??
⇒葉ダニと天敵(チリカブリダニ)では呼吸器の位置が違うからです。
葉ダニは胴体の横、天敵は腹の下に呼吸器があります。

天敵は腹の下に呼吸器があるから、上から被膜剤をかけられても窒息しにくい様です。

やまがたいちご楽園雅

今年は例年よりも大きく糖度も高い状態が続いています。「オーガニックエコフェスタ2021栄養価コンテスト」では初ノミネート!! 惜しくも最優秀賞は逃しましたが、昨年よりも評価が上がりました。関連農園「みとか」も無事にオープンできました。初日からたくさんの方が来られ賑わっております。今後も「雅」と「みとか」で山県市を盛り上げていきたいと思っております。